



Dose d'acétaminophène chez l'enfant

L'acétaminophène (p. ex. Tylenol, Tempra) est un médicament utilisé pour traiter la fièvre ou la douleur. Le tableau ci-dessous permet de déterminer la dose à donner à un enfant. Il est préférable de sélectionner la dose en fonction du poids de l'enfant plutôt qu'avec son âge et d'utiliser un instrument de mesure précis plutôt que des cuillères. Soyez vigilant, il existe plusieurs produits disponibles avec des concentrations d'acétaminophène différentes.

Pour déterminer la dose à administrer à l'enfant, suivre la procédure suivante :

- Identifier la ligne correspondant au poids de l'enfant (en livres ou en kilogrammes);
- Repérer la dose à donner selon le produit en votre possession;
- Administrer la dose aux 4 à 6 heures pour un maximum de 5 doses par 24 heures.





Nom de l'enfant :

Poids :

Produit :

Dose :

Dose d'acétaminophène pour les enfants âgés de plus de 3 mois

Poids	Âge (à titre indicatif)	Dose					
			gouttes orales 80 mg/mL	suspension orale 160 mg/5 mL	comprimé à croquer 80 mg	comprimé à croquer 160 mg	
12 à 17 lb	6 à 7 kg	4 à 11 mois	80 mg	1 mL	2.5 mL	1	-
18 à 23 lb	8 à 10 kg	12 à 23 mois	120 mg	1.5 mL	3.75 mL	1 1/2	-
24 à 35 lb	11 à 15 kg	2 à 3 ans	160 mg	2 mL	5 mL	2	1
36 à 47 lb	16 à 21 kg	4 à 5 ans	240 mg	3 mL	7.5 mL	3	1 1/2
48 à 59 lb	22 à 26 kg	6 à 8 ans	320 mg	4 mL	10 mL	4	2
60 à 71 lb	27 à 31 kg	9 à 10 ans	400 mg	5 mL	12.5 mL	5	2 1/2
72 à 95 lb	32 à 43 kg	11 ans	480 mg	6 mL	15 mL	6	3



Consultation médicale requise chez les enfants de 3 mois et moins qui présentent de la fièvre.

Nom du professionnel :

Date :

